

خلاصه:

- رشد کودک بخودی خود استرایبیسم را درمان نمی کند.
- موثرترین زمان درمان استرایبیسم زمانی است که کودک در سنین پاییزی به سر می برد.
- مستقیم نمودن چشم ها در هر سی امکان پذیر است و در این جریان حداقل دید جانبی بهبود خواهد یافت.
- درمان استرایبیسم ممکن است بدون جراحی و با تمرینات چشمی و یا عینک انجام گیرد.
- در صورتی که درمان جراحی لازم باشد هر قدر در سنین پایین تری انجام شود شانس تامین دید دو چشمی بیشتر خواهد بود.



وزارت علوم پژوهی  
و فناوری  
دانشگاه بهداشتی درمانی آرزو

مرکز آموزشی درمانی چشم نیکوکاری

آموزش بیمار

## استرایبیسم

(انحراف چشم یا لوچی)

عزیزی (سوپروایزر آموزشی)

۱۳۹۳

استرایبیسم نوعی مشکل چشمی است که در آن چشم ها وضعیت ناهمگونی نسبت به یکدیگر داشته و نگاه آنها به جهات مختلف است . این ناهمگونی ممکن است واضح بوده و یا آنکه صرفا بعضی اوقات وجود داشته باشد.در حالی که یک چشم مستقیما به سمت جلو نگاه می کند چشم دیگر به سمت داخل، بالا ، و یا پایین چرخیده است. چشم چرخیده بعضی اوقات به وضعیت اصلی و مستقیم برگشته و بر عکس چشم مستقیم از موقعیت خارج می شود.

## آمبليوپي

قرارگیری طبیعی چشم ها در طی دوره کودکی امکان تکامل دید مناسب این سنین را فراهم می سازد. قرارگیری غیر طبیعی مانند آنچه در استرایبیسم دیده می شود، سبب کاهش دید یا آمبليوپي خواهد شد. مغز تصویر چشم بهتر را تشخیص داده و تصویر چشم ضعیف تر یا آمبليوپيا را حذف می کند. این موضوع تقریبا در نیمی از کودکان مبتلا به استرایبیسم اتفاق می افتد. آمبليوپي را می توان با بستن چشم بهتر و تقویت و بهبود بینایی چشم ضعیف تر درمان نمود.. اما در صورتی که درمان به تأخیر بیفتد آمبليوپي یا افت دید ، وضعیت دائم پیدا می کند. هر قدر آمبليوپي زودتر

## تشخيص

درمان شود ، دید بهتری تامین خواهد شد .

لازم است هر کودکی در طی دوره شیرخواری یا سنین قبل از مدرسه توسط پزشک خانواده، متخصص اطفال یا چشم پزشک معاینه و مشکلات احتمالی او تشخیص داده شود. این موضوع بویژه در مواردی که عضو دیگری از خانواده مبتلا به استرایبیسم یا آمبليوپي است اهمیت بیشتری پیدا می کند .

## درمان :

اهداف درمان استرایبیسم، حفظ دید، مستقیم کردن چشم ها و بازگرداندن دید دو چشمی است. بسته به علت استرایبیسم، درمان ممکن است بصورت تجویز عینک، برداشتن کاتاراكت یا اصلاح سایر علل زمینه ای ایجاد انحراف و یا تغییر دادن موقعیت عضلات نامتعادل چشم باشد. بعد از انجام یک معاینه کامل چشمی شامل مطالعه دقیق قسمت های داخلی، چشم پزشک درمان مناسب اپتیکی، طبی یا جراحی را انتخاب خواهد نمود. اغلب بستن چشم بهتر جهت تقویت بینایی چشم آمبليوپيا نیز ضروری خواهد بود.

## جراحی :

جراحی استرایبیسم در واقع ایجاد بر Shi کوچک در بافت پوشاننده چشم است که به چشم پزشک امکان می دهد تا به عضلات زیرین این بافت دسترسی پیدا کند. گاهی اوقات لازم است هر دو چشم تحت عمل جراحی قرار گیرد. بهبودی سریع است. فرد اغلب ظرف چند روز به فعالیت های طبیعی اش برمی گردد. بعد از جراحی ، گاهی استفاده از عینک ضرورت پیدا می کند. گاهی اوقات ممکن است اصلاح انجام شده بیشتر یا کمتر از مقدار مورد نظر باشد که در آن صورت انجام عملی دیگر ضرورت خواهد یافت.

توصیه می شود جراحی اصلاحی استرایبیسم هر چه زودتر انجام گیرد زیرا شیرخوار به محض اینکه چشم هایش مستقیم شد امکان دید طبیعی و دید دو چشمی را پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر لوحچی می تواند بر اعتماد به نفس کودک نیز نقش منفی داشته باشد.