

مراقبت های بعد از آنژیوگرافی

تاثیر قطره های گشاد کننده مردمک تا چندین ساعت باقی می ماند و باعث تاری دید و حساسیت به نور می شود و به بیمار توصیه می شود عینک آفتابی با خود بیاورد و یک نفر همراه داشته باشد چون به دلیل تاری دید امکان رانندگی وجود ندارد.

به بیمار توصیه می شود مایعات فراوان مصرف کند و تا چند روز در معرض نور شدید آفتاب قرار نگیرد.

عوارض


شایع ترین واکنش در هنگام تزریق آمپول فلوئورسین تهوع و استفراغ است، این حالت گذرا است و با چند نفس عمیق از بین می رود.

خشکی دهان، افزایش ضربان قلب، تغییرات فشار خون و تاری دید و گاهی قرمز شدن دید ممکن است اتفاق بیفتد به بیمار توصیه می شود که این عوارض موقتی بوده و در طی چند دقیقه از بین می رود.


پس از آنژیوگرافی رنگ پوست بدن و سفیدی چشم به مدت چند ساعت زرد می شود.

رنگ ادرار به مدت ۲۴-۴۸ ساعت زرد پر رنگ یا نارنجی می شود

و به دلیل دفع کلیوی این دارو نوشیدن مایعات فراوان توصیه میشود تا از طریق کلیه ها دفع شود.



پمفلت آموزشی آنژیوگرافی چشمی



تهیه و تنظیم کننده:

طاهره عطار

سرپرستار پاراکلینیک

زمستان ۱۴۰۳

آنژیوگرافی چشم

این تست برای تشخیص اختلالات و ناهنجاریهای چشمی انجام می شود و پزشک برای تایید تشخیص خود و بررسی عروق شبکیه و خورسانی به آنها، این تست را توصیه می کند.

آنژیوگرافی برای تشخیص چه مشکلاتی استفاده می شود؟


۱-ورم ماکولا (تورم قسمتی از شبکیه که باعث اختلال در بینایی می شود).

۲-رتینوپاتی دیابتی (عروق شبکیه بر اثر دیابت آسیب می بیند یا رگهای غیر نرمال ایجاد می شود).

۳-تخریب ماکولا به علت پیری


۴-انسداد عروق چشم

۵-تجمع مایع در بین لایه های شبکیه



توصیه های قبل از آنژیوگرافی

- در صورت داشتن بیماریهای قلبی و کلیوی و حساسیت دارویی به پزشک اطلاع داده شود.
- رضایت نامه آنژیوگرافی را همراه داشته باشد.
- صبحانه مختصر میل نماید.
- یک نفر همراه داشته باشد.



آنژیوگرافی چشم چگونه انجام می شود؟

قبل از انجام آنژیوگرافی رضایت آگاهانه توسط پزشک گرفته می شود آنژیوگرافی کمتر از نیم ساعت طول می کشد. ابتدا در چشم بیمار قطره گشاد کننده مردمک ریخته می شود سپس آمپول فلوروسین در ورید بازویی تزریق می شود. در ۱۰ تا ۱۵ ثانیه ابتدایی رنگ فلوروسین در همه عروق بدن حرکت می کند و به عروق شبکیه چشم می رسد که باعث درخشان دیده شدن عروق چشم می شود.

هنگامی که رنگ فلوروسین به عروق شبکیه می رسد با دستگاه آنژیوگرافی از چشم عکس برداری می شود.



تزریق فلوروسین



دستگاه آنژیوگرافی